



Abrigo de morcegos
hematófagos

Atenção

Qualquer espécie de morcego, desde que contaminada com o vírus da raiva pode transmitir a doença.

Evite tocar em morcegos ou animais suspeitos de raiva. Sempre que houver contato, procure imediatamente uma Unidade de Saúde de seu município.

Colabore com a ADAPAR, comunicando a presença de possíveis abrigos de morcegos hematófagos e a presença de animais com sintomas da doença ou mordeduras em sua propriedade.

Sede da ADAPAR

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR
Rua dos Funcionários, 1559 - 80035-050 - Curitiba - PR
(41) 3313-4000 - Geral

Endereços das Unidades Regionais de Sanidade - URS

APUCARANA
Av. Dr. Munhoz da Rocha, 51
Apucarana - PR
CEP: 86.800-607
Fone/Fax: (43) 3422-7822 / (43) 3308-8805

CAMPO MOURÃO
Avenida João Bento, 1899
Campo Mourão - PR
CEP: 87.300-030
Fone/Fax: (44) 3523-6546 / (44) 3525-1375

CASCAVEL
Rua Antonina, 974
Cascavel - PR
CEP: 85.813-040
Fone/Fax: (45) 2101-4998

CIANORTE
Rua Tiradentes, 67 - Zona 01
Cianorte - PR
CEP: 87.200-105
Fone/Fax: (44) 3629-3800

CORNÉLIO PROCÓPIO
Av. Minas Gerais, 1351
Cornélio Procópio - PR
CEP: 86.300-000
Fone/Fax: (43) 3520-3700 / (43) 3520-3716

CURITIBA
Rua dos Funcionários, 1560
Curitiba - PR
CEP: 80.035-050
Fone/Fax: (41) 3313-4122

DOIS VIZINHOS
Rua Souza Naves, 77
Dois Vizinhos - PR
CEP: 85.660-000
Fone/Fax: (46) 3536- 8250 / (46) 3536-2848

FRANCISCO BELTRÃO
Rua Tenente Camargo - 1312 - Sala 7 -
Setor A - Centro | Francisco Beltrão - PR
CEP: 85.601-050
Fone/Fax: (46) 3905-3300

GUARAPUAVA
Rua Vicente Machado, 1827
Guarapuava - PR
CEP: 85.010-260
Fone/Fax: (42) 3303-2100

IRATI
Rua Coronel Emílio Gomes, 20
Irati - PR
CEP: 84.500-000
Fone/Fax: (42) 3421-3514

IVAIPORÃ
Av. Souza Naves, 2410
Ivaiporã - PR
CEP: 86.870-000
Fone/Fax: (43) 3472-8365

JACAREZINHO
Endereço: Rua do Rosário, 641
Jacarezinho - PR
CEP: 86.400-000
Fone/Fax: (43) 3525-7724 / (43) 3525-2627

LARANJEIRAS DO SUL
Rua Marechal Cândido Rondon, 2249 - sala 1
Laranjeiras do Sul - PR
CEP: 85.301-060
Fone/Fax: (42) 3635-1181

LONDRINA
Rua a Palheta, 103
Londrina - PR
CEP: 86.038-080
Fone/Fax: (43) 2104 -7900

MARINGÁ
Rua Artur Thomas, 410
Maringá - PR
CEP: 87.013 250
Fone/Fax: (44) 2103 - 5850

PARAMAGUÁ
Avenida Coronel José Lobo, 218
Paramaguá - PR
CEP: 83.203-280
Fone/Fax: (41) 3427-6350

PARANAVÁI
Rua Antônio Felipe, 2686
Paranavai - PR
CEP: 87.704-030
Fone/Fax: (44) 3421-1450

PATO BRANCO
Rua Silveira Martins, 456
Pato Branco - PR
CEP: 85.504-018
Fone/Fax: (46) 3309-2122

PONTA GROSSA
Rua Nestor Guimarães, 166
Ponta Grossa - PR
CEP: 84.040-130
Fone/Fax: (42) 2102-2744

TOLEDO
Avenida Parigot de Souza, 4300
Toledo - PR
CEP: 85.903-170
Fone/Fax: (45) 2103-5168

UMUARAMA
Parque de Exposições Dário Pimenta
Umuarama - PR
CEP: 87.507-013
Fone/Fax: (44) 3361-1333 / (44) 3361-1322

UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Professora Amazônia, 747
União da Vitória - PR
CEP: 86.400-285
Fone/Fax: (42) 3521-3800

Mais informações em www.adapar.pr.gov.br



RAIVA MATA

Proteja seu rebanho



ADAPAR
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná

O que é raiva?

É uma doença grave e fatal, causada por um vírus que ataca o sistema nervoso. Todos os animais mamíferos podem pegar raiva, inclusive os seres humanos.

Como se pega raiva?

Através da mordedura, arranhadura ou lambedura de um animal contaminado com o vírus da raiva.

Para os animais de criação (bovídeos, equídeos, caprinos, ovinos e suínos), a transmissão é feita principalmente pela mordedura de morcegos hematófagos da espécie *Desmodus rotundus*. Esses morcegos se alimentam exclusivamente de sangue.



▶ Bezerro com sinal clínico de raiva



▶ Morcego hematófago tratado com pasta vampiricida



▶ Mordedura de morcego hematófago

Quais os sinais da doença?

Nos animais de criação os principais sinais clínicos são:

- > Isolamento do rebanho;
- > Salivação;
- > Andar cambaleante e queda;
- > Paralisia dos membros com movimentos de pedalagem;
- > Morte.

Como controlar a raiva?

O controle é feito através da captura de morcegos hematófagos e do uso de pasta vampiricida.

A captura só pode ser feita por servidores da ADAPAR, treinados e vacinados contra a raiva.

O produtor pode e deve fazer uso da pasta vampiricida, ao redor das mordeduras de morcegos nos animais que forem atacados em sua propriedade.

O que fazer para prevenir a raiva?

- > Vacinar os animais de criação a partir dos 3 meses de idade;
- > Fazer um reforço (aplicar mais uma dose) após 30 dias;
- > Depois, revacinar todos os anos;
- > A vacina é barata e eficaz.

Como é feito o diagnóstico?

Através de um exame feito numa amostra colhida do cérebro do animal morto suspeito de estar com raiva. Essa colheita é feita pelos técnicos ou veterinários da ADAPAR, que enviam o material para o Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti - CDME, o laboratório de referência para raiva no estado do Paraná, para confirmar o diagnóstico.

Atenção: É importante que o animal morra da doença e não seja sacrificado, pois se isso ocorrer o exame poderá resultar em um falso negativo.

O **exame é gratuito** e o resultado sai rápido!



▶ Realização do exame de raiva no CDME