Sintomas em folhas


Sintomas em folhas

Sintomas de Pinta Preta não são observados com freqüência em folhas.

Quando ocorrem, são evidentes nas duas faces da folha e as lesões são semelhantes às da mancha preta ou dura observada nos frutos.



Sintomas em ramos



Medidas de Prevenção

Existem várias medidas que devem ser adotadas para evitar a doença ou minimizar seus prejuízos.

Mudas sadias

A aquisição deve ser feita em VIVEIROS CERTIFICADOS. As mudas são o meio mais importante de disseminação do fungo, pois as folhas podem estar infectadas sem apresentar os sintomas da doença.

Nutrição e sanidade

O pomar deve estar em boas condições de nutrição e sanidade. Plantas debilitadas e doentes são infectadas pelo fungo mais facilmente.

Trânsito no pomar

A desinfecção e retirada de restos de material vegetal dos veículos, máquinas, materiais de colheita e outros equipamentos, antes de entrarem na propriedade, auxiliam na prevenção porque eles podem conter o fungo que causa a doença. O citricultor deve ter o seu próprio material de colheita, prevenindo assim não só a Pinta Preta como também outras doenças. A instalação de estruturas de armazenamento na propriedade como bins, também auxiliam nesse sentido pois diminui o trânsito de caminhões na propriedade.